



В Тюмени определили, где выгодно привиться от клещевого энцефалита

Средняя цена на прививку от клещевого энцефалита в Тюмени составляет около 2 тысяч рублей. Рейтинг выгодных цен на услуги по иммунопрофилактике от опасной инфекции составили рейтинговое агентство “Сибирь” и специализированное медицинское сообщество “Медэксперт” (https://www.instagram.com/medexpert_tmtn/).

По результатам мониторинга стоимости медицинской услуги выяснилось, что самые низкие цены, до 2 тысяч рублей предлагают городские поликлиники (для взрослого населения – от 850 руб. до 1100 руб.), медицинские центры «Юни-Мед» (1590 руб.), «Мать и дитя» (1590 руб. взрослому и 1640 руб. ребенку), «Медис» (1620 руб.), «М+» (1650 руб. взрослому и 1800 руб. ребенку), «Доктор Арбитайло» (1650 руб.) и «Олимп» (1850 руб.) – для взрослых и детей. В стоимость услуги входит осмотр перед вакцинацией, вакцина российского производства и услуга по ее введению.

Свыше 2 тыс. рублей прививка от клещевого энцефалита стоит в медцентрах «Альфа» (2035 руб. для взрослого и 2095 руб. ребенку), «Доктор А» (2170 руб. для взрослого и 1650 руб. ребенку) «Вера» (2300 руб.), поликлинике им Е.М. Нигинского (2700 руб.).

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, на бесплатную прививку за счет средств ОМС претендует прежде всего группа риска: сотрудники бюджетных и муниципальных организаций, работающие в лесу и в полевых условиях. Для этих целей в конце марта в регион поступило 110 тыс. доз вакцины для взрослого населения. Для прохождения вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Тюменская область является территорией с высоким уровнем распространения клещей, поэтому экономить на вакцинации от клещевого энцефалита не стоит, предупреждают врачи. Иммунопрофилактика стимулирует выработку специфических антител к вирусу клещевого энцефалита – опасного и не поддающегося лечению заболевания. Антитела обеспечивают защиту от инфекции.

Напомним, что для завершения курса иммунопрофилактики понадобятся 3 введения вакцины с промежутком 5-6 месяцев между первыми двумя дозами, 12 месяцев между второй и третьей дозами. Далее каждые три года следует проводить ревакцинацию. Существует экстренная схема иммунизации, с промежутками между дозами 2 недели.